

## Biotransformation of a Tetrahydrofuran Lignan by the Endophytic Fungus *Phomopsis* Sp.

*Michelle Verza,<sup>a</sup> Nilton S. Arakawa,<sup>a</sup> Norberto P. Lopes,<sup>a</sup> Massuo J. Kato,<sup>b</sup> Mônica T. Pupo,<sup>a</sup>  
Suraia Said<sup>a</sup> and Ivone Carvalho<sup>\*,a</sup>*

<sup>a</sup>*Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,  
Av. do Café, s/n, 14040-903 Ribeirão Preto-SP, Brazil*

<sup>b</sup>*Instituto de Química, Universidade de São Paulo, Av. Lineu Prestes, 748, 05508-900 São Paulo-SP, Brazil*






Figure S1. High resolution mass spectrometry of compound 10.

\*e-mail: carronal@usp.br

Figure S2.  $^1\text{H}$  NMR of compound **10** (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).Figure S3. HMQC of compound **10**. (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).




Figure S4.  $^1\text{H}$  NMR of compound **6** (grandisin) (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).




Figure S5.  $^{13}\text{C}$  NMR of compound **6** (grandisin) (100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ).